

Caseo clínico

Paciente do gênero feminino, 30 anos, sofreu queda de um cavalo e apresentou dor na perna esquerda e impotência funcional.

Ao exame físico, edema na perna e ferimento puntiforme na face anteromedial da perna, com sangramento ativo contendo gotículas de gordura.





Figura 2: Radiografia dos ossos da perna esquerda em anteroposterior e perfil mostrando fratura diafisária da tíbia e fíbula esquerdas. A fratura da tíbia apresenta traço simples, oblíquo curto, com desvios lateral e anterior. Segundo a classificação AO, esta fratura é classificada como 42A2, pois a obliquidade do traço de fratura é maior que 30°.

Diagnóstico: Fratura exposta dos ossos da perna esquerda

Mensagens

- A fratura exposta é uma urgência ortopédica
- A ferida deve ser coberta com gaze estéril e o membro deve ser imobilizado, provisoriamente.
- A exploração da ferida e limpeza da mesma na sala de urgência estão contra-indicados.
- A utilização precoce de antimicrobianos é fator prognóstico importante na prevenção da osteomielite pós-traumática.
- É importante a avaliação da cobertura antitetânica
- O tratamento é cirúrgico: desbridamento, irrigação com soro fisiológico e fixação da fratura