

O CÂNCER NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE

O câncer na infância e na adolescência difere em vários aspectos do câncer na idade adulta.

No adulto, a maioria dos cânceres apresenta evolução lenta e na maioria das vezes são resultado da exposição a fatores de risco ambientais como tabagismo, etilismo, sedentarismo e obesidade. Muitas vezes é possível evitá-lo por meio da prevenção primária (diminuição ou eliminação da exposição a fatores de risco).

Já na criança e no adolescente, os cânceres em geral, os fatores ambientais exercem pouca ou nenhuma influência, dificultando as medidas de prevenção.

O diagnóstico precoce pode ser feito por meio do reconhecimento dos “sinais de alerta para suspeição do câncer na infância e adolescência”. É portanto, uma medida que pode permitir o tratamento da doença em estágio inicial e a utilização de tratamento menos agressivo e com menos efeitos colaterais, proporcionando melhores resultados com menos sequelas.

Fique atento para os seguintes sinais ou sintomas e caso você os identifique, procure o pediatra:

Para mais informações, acesse:

oncopeduida.wixsite.com/ufmg
medicina.ufmg.br/observaped

Referências:

Kaatsch, Peter. “Epidemiology of childhood cancer”. *Cancer treatment reviews* 36.4 (2010): 277-285;

“Diagnóstico precoce do Câncer na criança e no adolescente”. Instituto Nacional de Câncer, Instituto Ronald McDonald. – 2. ed. rev. ampl. – Rio de Janeiro: Inca, 2011.

SINAIS DE ALERTA PARA O CÂNCER NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Qualidade de vida e diagnóstico precoce do câncer na infância e adolescentes



SINAIS E SINTOMAS:

1



Febre

Febre persistente de causa não esclarecida, persistindo por mais que sete dias ou que não cede apesar do tratamento já estabelecido;

2



Emagrecimento

Perda de peso inexplicada. Principalmente se associada a suores noturnos, febre, tosse e falta de ar;

3



Sangramentos anormais

Manchas vermelhas ou roxas na pele, sangramento nasal ou gengival, sem relação com traumatismos devem ser valorizados;

4



Alterações oculares

Mancha branca no olho, redução ou perda da visão, hematomas ou inchaço ao redor dos olhos, estrabismo de início recente;

5



Caroços ou inchaços

maiores que 3 cm ou com crescimento rápido, endurecidos, imóveis e sem sinais de inflamação como vermelhidão, supuração, dor e calor;

6



Dor nos braços ou pernas ou dor óssea

A criança apresenta diminuição das suas atividades habituais, só quer ficar deitada, não quer brincar, fica irritada e tem dificuldade para dormir;

7



Palidez

Clareza incomum da cor da pele ou mucosas, quando comparada com o tom normal. Pode ser precedida ou acompanhada por outros sinais e sintomas: irritabilidade, sonolência, mal-estar, fadiga, sangramentos, dor de cabeça e tonteadas.

SE ESSES SINTOMAS ESTIVEREM PRESENTES, PROCURE UM PEDIATRA